

## GNOJNO VNETJE MATERNICE

### **Obolenje poznamo tudi pod latinskim imenom »metritis« in ga povzročata bakterijsko vnetje po kotitvi, splavu ali nesterilni umetni oploditvi**

Žal se vse premalo skrbnikov psičk zaveda prednosti sterilizacije. Ena od njih je zagotovo tudi preprečitev vnetja maternice, ki je včasih lahko tudi usodno. Seveda pa vsako vnetje maternične in / ali vaginalne sluznice ne ogroža življenja.

Oslabljen imunski sistem, ki slabo deluje proti mikrobom, splav, sredstva, ki preprečujejo gonitev, stanje neposredno po gonitvi, ko je maternični vrat odprt, .. to so stanja, ki so vnetjem naklonjena. Skrbnik postane pozoren na prve znake vnetja, ker se psička pogosteje liže po spolovilu. Če je izcedek jedek, potem to počne zelo intenzivno. Znaki akutnega vnetja so še napihnjen trebuh, zlepljene dlake na zadnjem delu stegen, povišana telesna temperatura, sled gostega izcedka na ležišču, kjer se psička zadržuje.

Poznamo kar nekaj stanj, ki jih lahko zdravimo homeopatsko ali uporabimo homeopatske pripravke kot dopolnilo sredstvom, ki jih predpiše veterinar. Sama sem pri pojavu gostega kremastega izcedka po gonitvi svoje psičke prvič uporabila antibiotik, ki ga je psička dobivala deset dni, ko pa se je enak izcedek pojavil tudi po naslednji gonitvi, sem se odločila za homeopatsko zdravljenje pod nadzorom veterinarja. Antibiotiki namreč delujejo proti vnetju, homeopatsko zdravljenje pa vpliva tudi na zmožnost organizma, da se pri naslednji gonitvi uspešno kosa z infekcijo. Vedno pa obstoja tudi možnost poslabšanja zdravstvenega stanja psa, če organizem kljub podpori ni kos infekciji. V takem primeru, ko se po preteku dveh dni stanje ne izboljša ali se celo poslabša, je potreben posvet z veterinarjem. V vsakem primeru ne glede na način zdravljenja je potrebno postaviti zanesljivo diagnozo in nadzorovati bolezen. Pri vnetju maternične sluznice je najpomembnejše, da se ohrani izločanje gnoja in se maternica ne zapre. Psička dobiva v ta namen pripravek Pulsatilla D 4. Ker je skoraj vedno prisoten gost izcedek rumenkaste barve, v vsakem primeru dajemo pripravka Pyrogenium CH 7 in Hepar sulfur CH 7, po pet granul vsakega zjutraj in zvečer v trajanju osem dni. Če se psička drži bolj zase, je videti otožna in odmaknjena, ji pomagamo s pripravkom Sepia CH 9. Tekom poteka boleznih se lahko zgodi, da se izcedek spreminja od gostega zeleno - rumenkastega do bolj tekočega in skoraj prosojnega, v tem primeru damo psičku pripravke Pulsatilla 9 CH, prav tako zjutraj in zvečer v trajanju osem dni.

Kadar se psička intenzivno liže, izcedek pa je belkast in gostejši kot npr. zobna pasta, damo psički pripravek Hydrastis CH 7 skupaj s Kalium bichromicum CH 7. Oba skupaj dajemo po pet granul zjutraj in zvečer prav tako osem dni. Slednji pripravek vedno uporabimo npr. tudi za zdravljenje nahoda z gnojnim izcedkom iz nosa in oči.

Hormonske injekcije za preprečevanje gonitve ali sprožitve splava so velikokrat posreden vzrok za vnetje sluznic, saj pošteno zamajejo ravnovesje v telesu. V takem primeru uporabimo Nux vomica CH 5 v odmerkih po pet granul zjutraj in zvečer v trajanju osem dni, hkrati pa še Thujo occidentalis CH 9 enkrat tedensko v enem odmerku. Zdravljenje s Thujo naj traja osem tednov. V kolikor so prisotne tudi prebavne težave (bruhanje, driska) in se stanje ponoči izrazito poslabša, poslabša pa se tudi v hladnih prostorih oziroma izboljša, če je psička na toplem, potem je to slika boleznih za dajanje pripravka Arsenicum album CH 7.

Dajemo ga v odmerkih po pet granul zjutraj in zvečer v trajanju osem dni.

Zaradi različnih vzrokov lahko pride tudi do vnetja nožnice, ki naj ga prav tako diagnosticira veterinar. Psička se liže, izcedek je lahko prosojen, redek ali gost in belkast. Mlajšim psičkam dajemo pripravek Mercurius D 6, starejšim pa Sepio D 6. Nekateri homeopati priporočajo sestavljen pripravek iz Lachesisa, Pyrogeniuma in Echinacee v nizkih potencah, dajemo ga dvakrat dnevno po pet granul v trajanju osem dni. Tako vnetje nožnice kot maternice pri psički imata očitne zunanje znake, tega pa ne moremo reči za gnojno vnetje maternice ali

pyometro, ki je zagotovo nočna mora vseh skrbnikov nesteriliziranih psičk. Naravne poti izločanja iz maternice so zaprte in gnoj se nabira znotraj maternice ter zastruplja organizem. Znaki, na katere moramo biti pozorni so povečana žeja, pomanjkanje apetita, utrujenost, bruhanje, povišana temperatura, izcedek iz nožnice... Psičko je potrebno čim prej odpeljati do veterinarja, ki bo presodil potrebnost kirurškega posega. Če je bila psička predhodno že zdravljena zaradi vnetja maternice, ji dajemo Arsenicum album, osem dni po pet granul zjutraj in zvečer, ter pripravek Silicea CH 7 po pet granul zjutraj in zvečer v trajanju 15 dni. Pri opisanih težavah je pomembno, da psičko opazujemo in po potrebi glede na spremenjeno sliko bolezni tudi zamenjamo homeopatski pripravek z ustrežnejšim.

Mojca Sajovic